



شرکت ماکان تجارت افق تدبیر
MAKAN TEJARAT CO.

MEGAMIX BEST FEED MAKAN TEJARAT CO.

ANALYSIS OF LAYER MEGA MIX PREMIX (PRODUCTION PERIOD)

آنالیز کنسانتره تخم گذار مگامیکس (دوران تولید)

Nutrients	Grade A	Grade B	Grade c	مواد مغذی
Metabolisable Energy(kcal/kg)	390	283	228/8	انرژی قابل متابولیسم (kcal/kg)
Crude Protein	4/56	3/27	2/64	حداکثر پروتئین خام.٪
Methionine(Digestible)	7/5	5/58	4/5	متیونین (قابل هضم).٪
Methionine+Cysteine(Digestible)	7/58	5/6	4/53	متیونین + سیستئین (قابل هضم).٪
Threonine(Digestible)	0/16	0/15	0/13	ترئونین قابل هضم.٪
Available Phosphorus	11	9/2	9/34	فسفر قابل دسترس
Calcium	11/55	9/6	9/78	کلسیم

مقدار و روش مصرف: ۲۵ کیلوگرم کنسانتره در یک تن خوراک مخلوط گردد. | How to use: Mix 25 kg in one ton of feeding powder.

DIET FORMULA BASED ON MEGA MIX PREMIX (PRODUCTION PERIOD)

جیره پیشنهادی بر اساس کنسانتره تخم گذار مگامیکس (دوران تولید)

Ration items	17th to 30th week از ابتدای هفته هفدهم تا پایان هفته سی ام	31st to 70th week از هفته سی و یکم تا پایان هفته هفتادم	71st to the end از هفته هفتاد و یکم تا پایان دوره	اقلام جیره
Corn	556	610	620	ذرت
Soybean meal (43% cp)	280	230	210	سویا
Soybean oil	30	10	10	روغن
Wheat bran	0	20	30	سبوس گندم
Limestone	95	95	95	کربنات کلسیم درشت
Megamix premix-A	30	0	0	کنسانتره نوع A تولید
Megamix premix-B	0	25	0	کنسانتره نوع B تولید
Megamix premix-C	0	0	25	کنسانتره نوع C تولید
Salt	2/2	2	1/8	نمک
Na bicarbonate	3/3	3	2/8	جوش شیرین
Allowed additives	3/5	5	5/4	افزودنیهای مجاز
Total	1000	1000	1000	جمع
Metabolisable Energy(Kcal/kg)	2730	2700	2700	انرژی قابل متابولیسم (kcal/kg)
Crude Protein	17/33	15/5	14/63	حداکثر پروتئین خام %
Methionine(Digestible)	0/47	0/4	0/38	متیونین(قابل هضم) %
Methionine+Cysteine(Digestible)	0/69	0/65	0/58	متیونین+سیستئین(قابل هضم) %
Threonine(Digestible)	0/56	0/5	0/46	ترئونین(قابل هضم) %
Available Phosphorus	0/42	0/22	0/22	فسفر قابل دسترس %
Calcium	4	3/92	3/92	کلسیم

■ مبنای محاسبه اسیدهای آمینه بر اساس میزان اسیدهای آمینه قابل هضم می باشد . ■ مبنای محاسبه درصد کلسیم کربنات و صدف ۳۷٪ می باشد .

■ با توجه به میزان شوری آب منطقه و تنوع اقلام خوراکی، نمک جیره تغییر یابد . ■ با افزایش سن گله و نیاز به کلسیم، اندازه ذرت و همچنین نسبت به دانه بندی منابع کلسیمی (کربنات کلسیم و صدف) توجه شود .